

ORTODONTIA PREVENTIVA

A Ortodontia Preventiva é uma área da Ortodontia que se concentra em prevenir ou minimizar problemas ortodônticos futuros em crianças e adolescentes.

Ela envolve a avaliação e o tratamento precoce de problemas de posicionamento dentário e esquelético com o objetivo de evitar ou reduzir a necessidade de tratamentos ortodônticos mais complexos e prolongados no futuro.

A seguir casos clínicos de Ortodontia Preventiva desenvolvido em crianças entre 4 e 7 anos de idade.

Obs.:

Temos a autorização dos responsáveis para a exposição dos caso clínicos.





MANTENEDOR DE ESPAÇO

Indica-se em situações de perda precoce de dentes decíduos (“de leite”) evitando-se fechamento de espaço para a erupção do dente permanente sucessor.

Mantenedor de espaço



Mantenedor de espaço



FECHAMENTO DE DIASTEMAS ANTERIORES

Indica-se em situações de excesso de espaço (diastema) entre incisivos superiores o que prejudicaria a erupção de demais dentes permanentes na região.

Fechamento de diastema anterior




Tempo: 60 dias

TRACIONAMENTO DE DENTE IMPACTADO

Indica-se em situações de retenção dentária intra-óssea prolongada prejudicando a erupção do dente em questão.

Tracionamento de dente impactado




Tempo: 120 dias

CORREÇÃO DE MORDIDA CRUZADA UNITÁRIA ANTERIOR


**Resumidamente, indica-se em condições
de incisivos e caninos cruzados**

Mordida cruzada anterior



Tempo: 14 dias

Mordida cruzada anterior




Tempo:
14 dias



Paciente de
4 anos e 6 meses





Mordida Cruzada anterior e posterior



Tempo: 60 dias




Paciente de 6 anos




***Porque temos a obrigação
clínica e profissional de
tratar uma mordida aberta
anterior?***

Veja as consequências




MORDIDA ABERTA

- **Atresia maxilar**
- **Atresia do seio maxilar**
- **Hipertrofia de amídalas**
- **Hipertrofia de adenóides**



- **Disfunção respiratória**
- **Respiração bucal**
- **Disfunção muscular**
- **Hipotonia labial**
- **Falta de vedamento labial**

MORDIDA ABERTA




- **Mordida cruzada**
- **Interferências oclusais**
- **Desgaste dental**

- **Disfunção muscular**
- **Disfunção articular**
- **Dor orofacial**

- **Assimetria facial**

MORDIDA ABERTA

- Interposição lingual
- Deglutição atípica
- Mastigação incorreta




- “Problemas gástricos”

MORDIDA ABERTA

- Fonação atípica

- Distúrbios do sono



- Distúrbios de aprendizagem

- Estética

etc, etc, etc

MORDIDA ABERTA

Fácies adenoideana

- Postura de boca aberta
- Nariz estreito com narinas pequenas
- Lábio superior curto
- Arco maxilar em forma de "V"
- Palato profundo ou ogival
- Incisivos superiores protruídos
- Relação oclusal de Classe II




Porque os pais precisam se preocupar com uma mordida aberta em seus filho?

Respondam vocês mesmos



Correção de mordida aberta por meio de grade palatina



Tempo: 90 dias



Agenesia dentária

(Ausência de formação dentária)



Tempo: 7 dias

A paciente foi encaminhada para as demais necessidades corretivas

"Foi o melhor presente de aniversário que eu já ganhei na minha vida!"

"Foi um dos melhores salários que eu já ganhei na minha vida!"



**“As pequenas coisas
fazem a perfeição,
mas a perfeição não é
pequena coisa “**

- Michelangelo

